



Préparation cutanée et muqueuse de l'opéré
Fiches techniques du service de chirurgie maxillo-faciale

Date d'application : 2012

Réf. :

Version : 1

Révision : en 2016

Page 3 sur 15

Fiche technique n°1 : information du patient de chirurgie maxillo-faciale avant une intervention chirurgicale (hospitalisation la veille)

Vous allez être hospitalisé(e) pour une intervention chirurgicale en chirurgie maxillo-faciale. Afin de participer au bon déroulement de votre séjour, il est nécessaire de respecter les recommandations suivantes pour une bonne hygiène générale.

A l'exception des interventions réalisées en urgence, le non respect de ces recommandations pourrait reporter votre intervention chirurgicale.

Affaires de toilette à prévoir :

- Gants de toilette propres
- Serviettes de toilette propres
- Savon de toilette liquide
- Brosse à dents neuve et non traumatisante (souple)
- Dentifrice
- Rasoir à main ou électrique
- Mousse ou gel à raser
- Brosse à cheveux et/ou peigne propre

Vêtements propres à prévoir :

- Pyjama ou chemise de nuit
- Sous-vêtement, chaussettes
- Chaussons ou mule
- Vêtements de rechange

Avant votre hospitalisation, il est indispensable de :

- Retirer tous vos bijoux (alliance comprise) et/ou piercing
- Retirer le vernis des ongles de pieds et des mains
- Couper vos ongles de pieds et de mains
- Retirer les faux ongles
- Retirer toute trace de maquillage (fond de teint, blush, ombres à paupières, mascara, rouge à lèvres)
- Remplacer les lentilles de contact par une paire de lunettes
- Pour les hommes : raser barbe et/ou moustache (règlement interne du service)

Le jour de votre hospitalisation, il sera nécessaire de :

- Prendre une douche et de réaliser un shampoing avec le produit moussant prescrit par le chirurgien et selon la fiche remise en consultation
- Après la douche, ne pas appliquer de lait corporel sur la peau, de déodorant ou eau de toilette, ni de laque ou de gel coiffant sur les cheveux
- Mettre des sous-vêtements et vêtements propres

Avant l'intervention chirurgicale et pour limiter les risques d'infection, il est nécessaire de respecter un délai minimum de 8 jours pour réaliser :

- Des soins dentaires ou détartrage
- Une épilation à la cire de la zone opérée (si nécessaire pour l'intervention)